

ยาพัฒนาจากสมุนไพร 21 รายการ (พ.ศ.2555)

ยาพัฒนาจากสมุนไพร 21 รายการ

ปี 2549

- ขมิ้นชัน
- จิง
- ชุมเห็ดเทศ
- ฟ้าทะลายโจร
- บัวบก
- พญายอ
- พริก
- ไพล

ปี 2555

- กล้วย มะขามแขก
- ทองพันชั่ง พลู
- เปลือกมังคุด เถาวัลย์เปรียง
- กระเจี๊ยบแดง หญ้าหนวดแมว
- มะระจีนก รากจืด
- หญ้าปักกิ่ง หญ้าดอกขาว
- น้ำมันไพล

ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินอาหาร

- ยากล้วย ยาผง (รพ.)
- ยาขมิ้นชัน ยาแคปซูล ยาเม็ด
ยาแคปซูล (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
- ยาชิง ยาแคปซูล ยาซอง
ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาซอง (รพ.)
- ยาชุมเห็ดเทศ ยาแคปซูล ยาซอง
ยาแคปซูล (รพ.) ยาซอง (รพ.)
- ยาฟ้าทะลายโจร ยาแคปซูล ยาเม็ด ยาลูกกลอน
ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)
- ยามะขามแขก ยาแคปซูล (รพ.) ยาซอง (รพ.)

ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินอาหาร

- **ยากล้วย** ยาผง (รพ.)
- **ข้อบ่งใช้** รักษาแผลในกระเพาะอาหาร บรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น อุจจาระไม่เป็นมูก หรือมีเลือดปน
- **ขนาดและวิธีใช้**
รับประทานครั้งละ 10 กรัม ชงน้ำร้อน 120 - 200 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
- **ข้อควรระวัง** - ไม่ควรใช้ในคนที่ท้องผูก
- การรับประทานติดต่อกันนาน ๆ อาจทำให้ท้องอืดได้
- อาการไม่พึงประสงค์ ท้องอืด แก้วด้วยน้ำจืด



ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินอาหาร

- **ยาขมิ้นชัน** ยาแคปซูล ยาเม็ดยาแคปซูล (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
- **ข้อบ่งใช้** บรรเทาอาการแน่นจุกเสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ
- **ขนาดและวิธีใช้**
รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน



ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินอาหาร

- **ยาขมิ้นชัน** ยาแคปซูล ยาเม็ดยาแคปซูล (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
- **ข้อห้ามใช้** ห้ามใช้ในผู้ที่ท่อน้ำดีอุดตัน หรือผู้ที่ไวต่อยานี้
- **ข้อควรระวัง**
 - ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคนี้วในถุงน้ำดี ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์
 - ควรระวังการใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์
 - ควรระวังการใช้ในเด็ก เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลด้านประสิทธิผลและความปลอดภัย
 - ควรระวังการใช้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และ ยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
 - ควรระวังการใช้ร่วมกับยาที่กระบวนการเมแทบอลิซึม ผ่านเอนไซม์ Cytochrome P450 (CYP) เนื่องจากสาร curcumin ยับยั้ง CYP3A4, CYP1A2 แต่กระตุ้นเอนไซม์ CYP2A6
 - ควรระวังการใช้ร่วมกับ ยารักษาโรคมะเร็งบางชนิด เช่น doxorubicin, chlormethine, cyclophosphamide และ camptothecin เนื่องจาก curcumin อาจมีผลด้านฤทธิ์ยาดังกล่าว

ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินอาหาร

- **ยาขิง** ยาแคปซูล ยาขง ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาขง (รพ.)
- **ขนาดและวิธีใช้**
 - บรรเทาอาการท้องอืด จุกเสียด แน่นจุกเสียด
รับประทานวันละ 2 – 4 กรัม
 - ป้องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน
จากการเมาเรือ รับประทานวันละ 1 – 2
กรัม ก่อนเดินทาง 30 นาที – 1 ชั่วโมง หรือเมื่อมี
อาการ
 - ป้องกันอาการคลื่นไส้ อาเจียน หลังการผ่าตัด
รับประทานครั้งละ 1 กรัม ก่อนการผ่าตัด 1
ชั่วโมง



ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินอาหาร

- **ยาจิง** ยาแคปซูล ยาซอง ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาซอง (รพ.)
- **ข้อควรระวัง** - ควรระวังการใช้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
 - ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคนี้ในถุงน้ำดี ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์
 - ไม่แนะนำให้รับประทานในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ
- **อาการไม่พึงประสงค์** อาการแสบร้อนบริเวณทางเดินอาหาร อาการระคายเคืองบริเวณปากและคอ

ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินอาหาร

- **ยาชุมเห็ดเทศ** ยาแคปซูล ยาชงยา
แคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.)
- **ข้อบ่งใช้** บรรเทาอาการท้องผูก
- **ขนาดและวิธีใช้**
- **ชนิดชง** รับประทานครั้งละ 3 – 6 กรัม
ชงน้ำร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร
นาน 10 นาทีวันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน
- **ชนิดแคปซูล** รับประทานครั้งละ 3 –
6 กรัม วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน



ชุมเห็ดเทศ
Senna alata

ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินอาหาร

- **ยาซึมเห็ดเทศ** ยาแคปซูล ยาขงยาแคปซูล (รพ.) ยาขง (รพ.)
- **ข้อห้ามใช้** ผู้ป่วยที่มีภาวะทางเดินอาหารอุดตัน หรือปวดท้องโดยไม่ทราบสาเหตุ
- **ข้อควรระวัง** - ควรระวังการใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี หรือในผู้ป่วย inflammatory bowel disease
 - การรับประทานยาในขนาดสูงอาจทำให้เกิดไตอักเสบ (nephritis)
 - ไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน เพราะจะทำให้ท้องเสีย ซึ่งส่งผลให้มีการสูญเสียน้ำและเกลือแร่มากเกินไป โดยเฉพาะ โพแทสเซียม และทำให้ลำไส้ใหญ่ ชินต่อยา ถ้าไม่ใช้ยาจะไม่ถ่าย
 - ควรระวังการใช้ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร
- **อาการไม่พึงประสงค์** อาจทำให้เกิดอาการปวดมวนท้อง เนื่องจากการบีบตัวของลำไส้ใหญ่

ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินอาหาร

- **ยาฟ้าทะลายโจร** ยาแคปซูล ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)
- **ตัวยาสำคัญ** พงจากส่วนเหนือดินของฟ้าทะลายโจร มี andrographolide ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก (w/w)
- **ข้อบ่งใช้** บรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น อุจจาระไม่เป็นมูกหรือมีเลือดปน
- **ขนาดและวิธีใช้**
รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม – 2 กรัม วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน
- **ข้อห้ามใช้** - ห้ามใช้ในผู้ที่มีอาการแพ้ฟ้าทะลายโจร
- ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร
เนื่องจากอาจทำให้เกิดทารกวิรูปได้



ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินอาหาร

- **ยามะขามแขก** ยาแคปซูล (รพ.)
ยาชง (รพ.)
- **ข้อบ่งใช้** บรรเทาอาการท้องผูก
- **ขนาดและวิธีใช้**
- **ชนิดชง** รับประทานครั้งละ 2 กรัม
ชงน้ำร้อนประมาณ 120 - 200
มิลลิลิตร ก่อนนอน
- **ชนิดแคปซูล** รับประทานครั้งละ
800 มิลลิกรัม – 1.2 กรัม ก่อนนอน



ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินอาหาร

- **ยามะขามแขก** ยาแคปซูล (รพ.) ยาขง (รพ.)
- **ข้อห้ามใช้** ผู้ป่วยที่มีภาวะทางเดินอาหารอุดตัน (gastrointestinal obstruction) หรือปวดท้องโดยไม่ทราบสาเหตุ
- **ข้อควรระวัง**
 - 1 ควรระวังการใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี หรือในผู้ป่วย inflammatory bowel disease
 - 2 การรับประทานยาในขนาดสูง อาจทำให้เกิดไตอักเสบ (nephritis)
 - 3 ไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้ท้องเสีย ซึ่งส่งผลให้มีการสูญเสียน้ำ และเกลือแร่มากเกินไปโดยเฉพาะโพแทสเซียม และการใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน จะทำให้ลำไส้ใหญ่ชินต่อยา ถ้าไม่ใช้ยาจะไม่ถ่าย
 - 4 ควรระวังการใช้ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร
- **อาการไม่พึงประสงค์** ปวดมวนท้อง ผื่นคัน

ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ

- **ยาฟ้าทะลายโจร** ยาแคปซูล ยาเม็ด ยาลูกกลอนยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)
- **ตัวยาสำคัญ** มี andrographolide ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก (w/w)
- **ขนาดและวิธีใช้** **บรรเทาอาการหวัด**
เจ็บคอ รับประทานครั้งละ 1.5 – 3 กรัม วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน



ฟ้าทะลายโจร
Andrographis paniculata

ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ

- ยาฟ้าทะลายโจร
- ข้อห้ามใช้ - ห้ามใช้ในผู้ที่มีอาการแพ้ฟ้าทะลายโจร
 - ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร เนื่องจากอาจทำให้เกิดทารกวิรูปได้
 - ห้ามใช้ฟ้าทะลายโจรสำหรับแก้เจ็บคอในกรณีต่าง ๆ ต่อไปนี้
 - ในผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บคอเนื่องจากติดเชื้อ *Streptococcus* group A
 - ในผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคไตอักเสบ เนื่องจากเคยติดเชื้อ *Streptococcus* group A
 - ในผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคหัวใจรูห์มาติก
 - ในผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บคอเนื่องจากมีการติดเชื้อแบคทีเรีย และมีอาการรุนแรง เช่น มีตุ่มหนองในคอ มีไข้สูง และหนาวสั่น

ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ

- ยาฟ้าทะลายโจร

- ข้อควรระวัง
 - หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำให้แขนขามีอาการชาหรืออ่อนแรง
 - หากใช้ฟ้าทะลายโจรติดต่อกัน 3 วัน แล้วไม่หาย หรือ มีอาการรุนแรงขึ้นระหว่างใช้ยาควรหยุดใช้และพบแพทย์
 - ควรระวังการใช้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
 - ควรระวังการใช้ร่วมกับยาลดความดันเลือดเพราะอาจเสริมฤทธิ์กัน
 - ควรระวังการใช้ร่วมกับยาที่กระบวนการเมแทบอลิซึม ผ่านเอนไซม์ Cytochrome P450 (CYP) เนื่องจากฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ CYP1A2, CYP2C9 และ CYP3A4
- อาการไม่พึงประสงค์ อาจทำให้เกิดอาการผิดปกติของทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง ท้องเดิน คลื่นไส้ เบื่ออาหาร วิงเวียนศีรษะ ใจสั่น และอาจเกิดลมพิษได้

ยารักษากลุ่มอาการทางระบบผิวหนัง

- ยาทิงเจอร์ทองพันชั่ง ทิงเจอร์ (รพ.)
- ยาทิงเจอร์พลู ทิงเจอร์ (รพ.)
- ยาบัวบก ยาคีรีม ยาคีรีม (รพ.)
- ยาเปลือกมังคุด ยาน้ำใส (รพ.)
- ยาพญายอ ยาคีรีม ยาโลชั่น สารละลาย (สำหรับป้ายปาก) ยาโลชั่น (รพ.) สารละลาย (สำหรับป้ายปาก) (รพ.) ยาขี้ผึ้ง (รพ.) ทิงเจอร์ (รพ.)

ยารักษากลุ่มอาการทางระบบผิวหนัง

- **ยาทิงเจอร์ทองพันชั่ง** ทิงเจอร์ (รพ.)
- **ตัวยาสำคัญ** สารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์จากใบทองพันชั่งสด ร้อยละ 10 w/v
- **ข้อบ่งใช้** ทาแก้กลากเกลื้อน โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา น้ำกัดเท้า
- **ขนาดและวิธีใช้** ทาบริเวณที่มีอาการ วันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น ทาจนกว่าจะหาย และใช้ต่อเนื่องอีกอย่างน้อย 2 สัปดาห์
- **ข้อห้ามใช้** ห้ามทาบริเวณขอบตาและเนื้อเยื่ออ่อน ห้ามทาบริเวณผิวหนังที่มีบาดแผลหรือมีแผลเปิด




ทองพันชั่ง

Rhinacanthus nasutus

ยารักษากลุ่มอาการทางระบบผิวหนัง

- **ยาทิงเจอร์พลู** ทิงเจอร์ (รพ.)
- **ตัวยาสำคัญ** สารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์จากใบพลูสด ร้อยละ 50 โดย น้ำหนักต่อปริมาตร
- **ข้อบ่งใช้** บรรเทาอาการผิวหนังอักเสบ อาการอักเสบจากแมลง กัด ต่อย
- **ขนาดและวิธีใช้** ทาบริเวณที่มีอาการ วันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น
- **ข้อห้ามใช้** ห้ามทาบริเวณขอบตาและเนื้อเยื่ออ่อน ห้ามทาบริเวณผิวหนังที่มีบาดแผลหรือมีแผลเปิด
- **อาการไม่พึงประสงค์** เมื่อทาติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำให้ผิวหนังเป็นสีดำ แต่เมื่อหยุดยาแล้วอาการจะหายไป



พลู

Piper betle

ยารักษากลุ่มอาการทางระบบผิวหนัง


- **ยาบัวบก** ยาคีรีม ยาคีรีม (รพ.)
- **ตัวยาสำคัญ** สารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ของใบบัวบกแห้ง ร้อยละ 7 โดยน้ำหนัก (w/w)
- **ข้อบ่งใช้** ใช้สมานแผล
- **ขนาดและวิธีใช้** ทำความสะอาดแผลด้วยยาฆ่าเชื้อก่อน ทายา ใช้ทาบริเวณที่เป็นแผลวันละ 1 - 3 ครั้ง หรือ ตาม แพทย์สั่ง
- **ข้อห้ามใช้** - ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้พืชในวงศ์ Apiaceae (Umbelliferae) เช่น ยี่หระ ผักชี
 - ห้ามใช้ในผู้ที่มึนประวัติเป็นโรคมะเร็งผิวหนัง
 - ห้ามใช้ในแผลเปิด
- **ข้อควรระวัง** ควรหลีกเลี่ยงการใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน
- **อาการไม่พึงประสงค์** มีรายงานว่า การทาสารสกัดใบ บัวบกชนิดขี้ผึ้งหรือผง อาจทำให้เกิดผื่นแพ้สัมผัสได้



บัวบก
Centella asiatica

ยารักษากลุ่มอาการทางระบบผิวหนัง

- **ยาเปลือกมังคุด** ยาน้ำใส (รพ.)
- **ตัวยาสำคัญ** สารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ของเปลือกมังคุดแห้ง ร้อยละ 10 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร (w/v)
- **ข้อบ่งใช้** ใช้ภายนอกสำหรับทาแผลสดและแผลเรื้อรัง
- **ขนาดและวิธีใช้** ทาบริเวณที่มีอาการ วันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น
- **ข้อห้ามใช้** ห้ามทาบริเวณขอบตาและเนื้อเยื่ออ่อน
- **ข้อมูลเพิ่มเติม** แพทย์แผนโบราณใช้เปลือกมังคุดฝนกับน้ำปูนใสรักษาแผลเบาหวาน



ยารักษากลุ่มอาการทางระบบผิวหนัง

- ยาพญายอ
- ข้อบ่งใช้ 1. ยาครีม (4 - 5% w/w) บรรเทาอาการของเริมและงูสวัด
- 2. สารละลาย (สำหรับป้ายปาก 2.5 - 4% w/w) รักษาแผลในปาก (aphthous ulcer) แผลจากการฉายรังสีและเคมีบำบัด
- 3. โลชั่น (1.25 %w/w) บรรเทาอาการ ผดผื่นคัน ลมพิษ ตุ่มคัน
- 4. ยาขี้ผึ้ง (4 - 5% w/w) บรรเทาอาการอักเสบ ปวด บวมจากแมลงกัดต่อย
- 5. ทิงเจอร์พญายอ (10% w/v) บรรเทาอาการของเริม และงูสวัด
- ขนาดและวิธีใช้ ทาบริเวณที่มีอาการ วันละ 5 ครั้ง



พญายอ
Clinacanthus nutans

ยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก

- ยาสำหรับรับประทาน

ยาแอสไพริน

ยาแคปซูล (รพ.)

- ยาสำหรับใช้ภายนอก

ยาพริก

ยาเจล

ยาครีม (รพ.) ยาเจล(รพ.) ยาขี้ผึ้ง (รพ.)

ยาไฟล

ยาครีม

ยาน้ำมันไฟล

ยาน้ำมัน (รพ.)

ยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก

- **ยาเถาวัลย์เปรียง** ยาแคปซูล (รพ.)
- ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม – 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารทันที
- ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์
- ข้อควรระวัง - ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคแผลเปื่อยเพปติก เนื่องจากเถาวัลย์เปรียงออกฤทธิ์คล้ายยาแก้ปวดกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs)
 - อาจทำให้เกิดการระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร
- อาการไม่พึงประสงค์ ปวดท้อง ท้องผูก ปัสสาวะบ่อย คอแห้ง ใจสั่น



ยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก

- **ยาพริก** ยาเจล ยาครีม เจล และขี้ผึ้ง (รพ.)
- **ตัวยาสำคัญ** ยาที่มีสารสกัดจากผลพริกแห้ง โดยควบคุมความแรงของสาร capsaicin ในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปร้อยละ 0.025 โดยน้ำหนัก (w/w)
- **ข้อบ่งใช้** บรรเทาอาการปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ
ขนาดและวิธีใช้ ทาบริเวณที่ปวด 3 - 4 ครั้ง ต่อวัน
- **ข้อห้ามใช้** - ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้ capsaicin
 - ห้ามสัมผัสบริเวณตา
 - ระวังอย่าทาเจลบริเวณผิวหนังที่บอบบางหรือบริเวณผิวหนังที่แตก เนื่องจากทำให้เกิดอาการระคายเคือง
- **อาการไม่พึงประสงค์** ผิวหนังแดง ปวด และแสบร้อน



ยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก

- **ยาไฟล** ยาครีม
- รูปแบบและความแรง ยาครีม ที่มีปริมาณน้ำมันระเหยง่าย 14 % v/w
- **ตัวยาสำคัญ** น้ำมันหอมระเหยง่ายจากเหง้าไฟล
- **ข้อบ่งใช้** บรรเทาอาการบวม ฟกช้ำ เคล็ดขัดยอก
- **ขนาดและวิธีใช้** ทาและถูเบา ๆ บริเวณที่มีอาการวันละ 2 - 3 ครั้ง
- **ข้อห้ามใช้**
 - ห้ามทาบริเวณขอบตาและเนื้อเยื่ออ่อน
 - ห้ามทาบริเวณผิวหนังที่มีบาดแผลหรือมีแผลเปิด



ยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก

- **ยาน้ำมันไพล** ยาน้ำมัน (รพ.)
- **ตัวยาสำคัญ** สารสกัดน้ำมันไพล ได้จากการทอด (hot oil extract) ไม่น้อยกว่า 90 %
- **ข้อบ่งใช้** บรรเทาอาการบวม ฟกช้ำ เคล็ดขัดยอก
- **ขนาดและวิธีใช้** ทาและถูเบา ๆ บริเวณที่มีอาการวันละ 2 - 3 ครั้ง
- **ข้อห้ามใช้**
 - ห้ามทาบริเวณขอบตาและเนื้อเยื่ออ่อน
 - ห้ามทาบริเวณผิวหนังที่มีบาดแผลหรือมีแผลเปิด



ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะ

- ยากระเจี๋ยบแดง ยาซอง (รพ.)
- ยาหญ้าหนวดแมว ยาซอง (รพ.)

ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะ

- ยากระเจี๊ยบแดง ยาชง (รพ.)
- ข้อบ่งใช้ ขับปัสสาวะ แก้ขัดเบา
- ขนาดและวิธีใช้รับประทาน
ครั้งละ 2 – 3 กรัม ชงน้ำร้อน 120 – 200 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง
หลังอาหาร



กระเจี๊ยบแดง
Hibiscus sabdariffa

ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะ

- ยากระเจี๊ยะบแดง ยาซง (รพ.)
- ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง
- ข้อควรระวัง กระเจี๊ยะบแดงอาจทำให้เกิดอาการท้องเสียได้ เนื่องจากมีฤทธิ์เป็นยาระบาย
- อาการไม่พึงประสงค์ อาจมีอาการปวดมวนท้องได้
- ข้อมูลเพิ่มเติม
 - ควรหลีกเลี่ยงการกินกระเจี๊ยะบแดงติดต่อกันเป็นเวลานาน เนื่องจากผลการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่า ทำให้เกิดพิษต่อเซลล์ของอวัยวะและตัวอสุจิได้
 - ควรหลีกเลี่ยงการกินกระเจี๊ยะบแดงติดต่อกันเป็นเวลานานในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร เนื่องจากผลการศึกษาในหนู (rat) พบว่าอาจทำให้ลูกหนูเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ช้าลง

ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะ

- ยาหญ้าหนวดแมว ยาชง (รพ.)
- ข้อบ่งใช้ ขับปัสสาวะ แก้ขัดเบา ขับนิ่วขนาดเล็ก
- ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ 2 - 3 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร ดื่มวันละ 2 - 3 ครั้ง



หญ้าหนวดแมว
Orthosiphon aristatus

ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะ

- ยาหญ้าหนวดแมว ยาชง (รพ.)
- ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของหัวใจและ/หรือไตบกพร่อง
- ข้อควรระวัง
 - ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ต้องจำกัดปริมาณโพแทสเซียม เช่น ผู้ที่เป็นโรคหัวใจเนื่องจากยาหญ้าหนวดแมวมีปริมาณโพแทสเซียมสูง
 - ควรระวังการใช้ร่วมกับยาลดน้ำตาลในเลือดชนิดรับประทาน (Oral hypoglycemic agents) หรือร่วมกับการฉีดอินซูลิน เพราะอาจทำให้เกิดการเสริมฤทธิ์กันได้

ยาแก้ไข้ แก้ร้อนใน

- ยาบัวบก ยาแคปซูล (รพ.) ยาซอง (รพ.)
- ยามะระจันทน์ก ยาแคปซูล (รพ.) ยาซอง (รพ.)
- ยารางจืด ยาแคปซูล (รพ.) ยาซอง (รพ.)
- ยาหญ้าปักกิ่ง ยาแคปซูล (รพ.) ยาซอง (รพ.)

ยาแก้ไข้ แก้ร้อนใน

- **ยาบัวบก** ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.)
- ข้อบ่งใช้ แก้ไข้ แก้ร้อนใน ช้ำใน
- ขนาดและวิธีใช้
- **ชนิดชง** รับประทานครั้งละ 2 - 4 กรัม ชงน้ำ ร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
- **ชนิดแคปซูล** รับประทานครั้งละ 400 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
- **ข้อห้ามใช้** ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้สมุนไพรวงศ์ Apiaceae (Umbelliferae)



ยาแก้ไข้ แก้ร้อนใน

- **ยาบัวบก** ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.)
- ข้อควรระวัง - ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกเนื่องจาก อาจบดบังอาการของไข้เลือดออก
 - หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์
 - หลีกเลี่ยงการใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้เกิดพิษต่อตับได้ในผู้ป่วยบางราย
 - ควรระวังการใช้ร่วมกับยาที่มีผลต่อตับ ยาขับปัสสาวะ และยาที่มีผลข้างเคียงทำให้ง่วงนอน เพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้
 - บัวบกอาจเพิ่มระดับน้ำตาลและคอเลสเตอรอลในเลือด และทำให้ประสิทธิภาพของยา ลดน้ำตาลและยาลดคอเลสเตอรอลลดลง
 - ควรระวังการใช้ร่วมกับยาที่มีกระบวนการเมแทบอลิซึมผ่าน Cytochrom P450 (CYP) เนื่องจาก บัวบกมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ CYP2C9 และ CYP2C19
- อาการไม่พึงประสงค์ ง่วงนอน คลื่นไส้ อาเจียน แสบท้อง มวนท้อง ท้องอืด และปัสสาวะบ่อย

ยาแก้ไข้ แก้ร้อนใน

- **ยामะระจันทน์** ยาแคปซูล ยาขง (รพ.)
- **ข้อบ่งใช้** แก้ไข้ แก้ร้อนใน เจริญอาหาร
- **ขนาดและวิธีใช้**
- **ชนิดขง** รับประทานครั้งละ 1 – 2 กรัม
ขงน้ำร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร
วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
- **ชนิดแคปซูล** รับประทานครั้งละ 500
มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อน
อาหาร



ยาแก้ไข้ แก้ร้อนใน

- **ยामะระจื๊น** ยาแคปซูล (รพ.) ยาขง (รพ.)
- **ข้อห้ามใช้** ห้ามใช้ในเด็กหรือในหญิงให้นมบุตร เนื่องจากมีรายงานว่าทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงอย่างมากจนเกิดอาการชักในเด็กได้
- **ข้อควรระวัง** - ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก
 - หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วันแล้ว อาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์
 - ควรระวังการใช้ ร่วมกับยาลดน้ำตาลในเลือดชนิดรับประทาน (Oral Hypoglycemic Agents) อื่น ๆ หรือร่วมกับการฉีดอินซูลิน เพราะอาจทำให้เกิดการเสริมฤทธิ์กัน
 - ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคตับ เพราะเคยมีรายงานว่าทำให้เกิดตับอักเสบได้
- **อาการไม่พึงประสงค์** คลื่นไส้ วิงเวียน ชาปลายมือปลายเท้า hypoglycemic coma อาการชักในเด็ก ท้องเดิน ท้องอืด ปวดศีรษะ และอาจเพิ่มระดับเอนไซม์ gamma-glutamyl transferase และ alkaline phosphatase ในเลือดได้

ยาแก้ไข้ แก้ร้อนใน

- **ยารางจืด** ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.)
- ข้อบ่งใช้ ถอนพิษไข้ แก้ร้อนใน
- ขนาดและวิธีใช้
- **ชนิดชง** รับประทานครั้งละ 2 - 3 กรัม
ชงน้ำร้อน 120 - 200 มิลลิลิตร วันละ 3
ครั้งก่อนอาหาร หรือเมื่อมีอาการ
- **ชนิดแคปซูล** รับประทานครั้งละ 500
มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อน
อาหาร



ยาเขียว รางจืด
Thunbergia laurifolia

ยาแก้ไข้ แก้ร้อนใน

- **ยารางจืด** ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.)
- ข้อควรระวัง
 - ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก
 - หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วันแล้ว อาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์
 - ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยเบาหวาน เพราะอาจเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
 - ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาอื่นอย่างต่อเนื่องเพราะยารางจืด อาจเร่งการขับยาเหล่านั้นออกจากร่างกาย ทำให้ประสิทธิผลของยาลดลง
- ข้อมูลเพิ่มเติมทางการแพทย์แผนไทย จะใช้ใบหรือราก ตำและคั้นน้ำชาวก้าวรับประทานแก้พิษผัดสำแดง

ยาแก้ไข้ แก้ร้อนใน

- **ยาหญ้าปักกิ่ง** ยาแคปซูล ยาชง (รพ.)
- **ข้อบ่งใช้** แก้ไข้ แก้ร้อนใน แก่น้ำเหลืองเสีย
- **ขนาดและวิธีใช้**
- **ชนิดชง** รับประทานครั้งละ 2 – 3 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 – 200 มิลลิลิตรวันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
- **ชนิดแคปซูล** รับประทานครั้งละ 400 - 500 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร



ยาแก้ไข้ แก้ร้อนใน

- ยาหญ้าปักกิ่ง ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.)
- ข้อควรระวัง – ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก
เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก
 - หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น
ควรปรึกษาแพทย์
- ข้อมูลเพิ่มเติม ภูมิปัญญาเดิมใช้ทั้งต้น คั้นน้ำแล้วตั้งทิ้งไว้เพื่อให้
ตกตะกอน แล้วนำส่วนใสไปรับประทาน

ยาถอนพิษเบื่อเมา

- **ยารางจืด** ยาชง (รพ.)
- **ขนาดและวิธีใช้** รับประทานครั้งละ 2 – 3 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร หรือเมื่อมีอาการ
- **ข้อควรระวัง** - ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยเบาหวาน เพราะอาจเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
 - ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาอื่นอย่างต่อเนื่อง เพราะ ยารางจืด อาจเร่งการขับยาเหล่านั้นออกจากร่างกาย ทำให้ ประสิทธิภาพของยาลดลง



ยาเขียว รางจืด
Thunbergia laurifolia

ยาลดความอยากบุหรี่

- **ยาหญ้าดอกขาว** ยาชง (รพ.)
- ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ 2 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร หลังอาหาร วันละ 3 - 4 ครั้ง
- ข้อควรระวัง ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจ และโรคไต เนื่องจากยาหญ้าดอกขาวมีโพแทสเซียมสูง
- อาการไม่พึงประสงค์ ปากแห้ง
คอแห้ง



ยาที่มีสารสกัดบริสุทธิ์หรืออนุพันธ์ที่ได้จากสมุนไพร

- 1 ยารักษาไข้จับสั่น
- 2 ยาบรรเทาอาการไอ
- 3 ยาบรรเทาปวด ลดไข้
- 4 ยารักษาโรคกระเพาะ
- 5 ยารักษาโรคผิวหนัง
- 6 ยาลดอาการอักเสบบวม
- 7 ยารักษามะเร็ง
- 8 ยาโรคหัวใจ
- 9 ยาขยายหลอดเลือด เช่น
- 10 ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อย
- 11 ยาทาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก

ยารักษาไข้จับสั่น

- ยาเม็ดควินินซัลเฟต (ชิง โคนา)
- Artesunate tablet

ยารักษาไข้จับสั่น



ยารักษาไข้จับสั่น






สะเดาอินเดีย คินีนา
Neem (*Azadirachta indica*)



สะเดาอินเดีย ควินิน
Neem (*Azadirachta indica*)

ยารักษาไข้จับสั่น





Qinghao

โกฐจุฬาลัมพา

Artemisia annua



Qinghao

โถงจุฬาลำพา

Artemisia annua



โกฐจุฬาลัมพา
Artemisia vulgaris

ยาบรรเทาอาการไอ

- Bisolvon
- Codipront, Ropect

ยาบรรเทาอาการไอ



ไบโซลวอน®

Batch No: 12010082

Mfg. Date: 12-01-2012

EXP/Best before: 11-01-2015

Price: 45.00

Bisolvon®

Tablets

Bromhexine hydrochloride 8 mg

Reduces sputum
and eases cough

10 X 10 tablets



Boehringer
Ingelheim



BATCH 12010082/MFD 01 2012/EXP 01 2015





เสี้ยนียด (บัวสาขาว)

ยาบรรเทาอาการไอ



มีสาร codeine ที่ได้จากฝิ่น มีฤทธิ์บรรเทาอาการไอ



ยาบรรเทาปวด ลดไข้

- Cafergot, Avamigran, Tofago
(Ergotamine จาก Ergot และสาร Caffeine)
- Aspirin
- Colchicine
- Buscopan

ยาบรรเทาปวดไมเกรน



ยาบรรเทาปวดไมเกรน





กาแฟ



กาแฟ



Caffeine ทำให้เส้นเลือดในสมองหดตัว แต่ทำให้เส้นเลือดตามร่างกายขยายตัว

ยาบรรเทาปวด ลดไข้



ยาบรรเทาปวด ลดไข้





willow

ตัดต่อภาพจาก Internet



ภาพจาก Internet

ยาบรรเทาปวดเก๊าท์



100 เม็ด

โคลชิซิน

เอกสารกำกับยา

ส่วนประกอบ : ในเม็ดยา 1 เม็ด ประกอบด้วย COLCHICINE 0.6 mg

ข้อบ่งใช้ : ใช้สำหรับบรรเทาอาการในโรคเก๊าท์ชนิดเฉียบพลัน และใช้ระดับประคองเพื่อป้องกันอาการซ้ำ

ขนาดใช้ : ปกติควรใช้ยานี้พร้อมอาหารหรือนม

ขนาดปกติสำหรับรักษา รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ทุก 1-2 ชั่วโมง จนอาการบรรเทาลง

ขนาดระดับประคอง ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1-3 ครั้ง หรือตามแพทย์สั่ง

ผลภาวะการเก็บยา : เก็บยาที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30°ซ ห่างจากความชื้นและแสงแดด

เลขที่มอก

วันขึ้นมอก

ยาสิ้นอายุ

4057
12.7.47
12.7.50



ดองดึงหัวขวาน



ดองดึงหัวขวาน

ยาบรรเทาปวดเกร็งในช่องท้อง





Atropa belladonna L.
©Thomas Schoepke

ภาพจาก Internet



Atropa belladonna

ภาพจาก Internet

ยารักษาโรคกระเพาะ





พบสาร plaunotol ในต้นเป็ล่านอย



๗ ๗
เปตานอย

Croton stellatopilosus



Croton sp.



เปล้าใหญ่
Croton roxburghii



เปตานอย

Croton stellatopilous



เปล้าใหญ่

Croton roxburghii

ยารักษาโรคผิวหนัง







槐花 huái huā ทำให้เลือดเย็นลง ใช้ห้ามเลือด ให้สาร rutin



ชวษชวษ

ยาลดอาการอักเสบบวม





Horse chest nut

ตัดต่อภาพจาก Internet

ยารักษามะเร็ง

- Vincristine, Vinblastin
- Taxol

ยารักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองและเม็ดเลือด




Vinblastine : Hodgkin's disease

Vincristine : Leukaemia in children (yield 0.0002%)

ยารักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองและเม็ดเลือด



ราก ขับพยาธิ แก้บิด ขับระดู ใบ ยาถ่าย บำรุงหัวใจ



Vinblastine $R = \text{CH}_3$

Vincristine $R = \text{CHO}$



ฟังพวยฝรั่ง

ยารักษามะเร็งเต้านมและรังไข่





Pacific Yew

ภาพจาก Internet



Pacific Yew

ตัดต่อภาพจาก Internet





ตัดต่อภาพจาก Internet

ยารักษาต่อมลูกหมากโต





Saw Palmetto

ตัดต่อภาพจาก Internet

ยาโรคหัวใจ





Foxglove



Foxglove

ยาขยายหลอดลม

- Nuelin -SR 200
- Ephedrine

ขยายยาหยอดคัดจมูก

NUELIN™ – SR 200
BRONCHODILATOR

100 Tablets

EACH TABLET CONTAINS:
THEOPHYLLINE B.P. 200 mg
IN A SUSTAINED RELEASE FORM

NUELIN™ - SR 200
BRONCHODILATOR

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

IMPORTANT:
TABLETS MUST NOT BE CRUSHED
OR CHEWED.

DOSAGE:
AS DIRECTED BY A PHYSICIAN.

READ INSTRUCTIONAL LEAFLET
BEFORE USE.

KEEP TIGHTLY CLOSED.

STORE BELOW 30°C

MADE IN AUSTRALIA







شا

ยาขยายหลอดลม



Ma huang (มั่วฮั้ง)



Ephedra



Ephedra



รากใช้ห้ามเหงื่อ ส่วนต้นใช้ขับเหงื่อ

ยาทาบรรเทาอาการปวดเมื่อย

- Wintergreen oil / Methyl salicylate
น้ำมันระกำ
- Menthol
- Camphor
- Clove oil
- Thymol oil
- Etc.









ตัดต่อภาพจาก Internet

Muscular Aches and Pain

Counterpain

Cool®

Relieves Muscular Aches and Pain

Counterpain®
METHYL SALICYLATE, MENTHOL, EUGENOL

Analgesic Balm



TAISHO

60 grams

Rub-in Counterpain analgesic balm for relief of muscular aches, arthritic and rheumatic pain, strains and sprains.

Easy to apply.
For external use only.

Active ingredients:
Methyl Salicylate 10.2%
Eugenol 1.36 %
Menthol 5.44 %

Store below 30° C.

Manufactured by:
PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk., Bogor - Indonesia
Under Authority of **Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.**, Tokyo, Japan
Imported by:
Osotspa Taisho Pharmaceutical Co., Ltd., Bangkok, Thailand



8 995201 80

60 grams

Apply Counterpain Cool analgesic gel for relief of minor aches and pains associated with strains, sprains, bruises and sport injuries.

Easy to apply.

For external use only.

Do not use with heating pads or heating devices.

Active ingredient: Menthol 4%

Store below 30°C

Manufactured by:
PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk., Bogor - Indonesia
Under Authority of **Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.**, Tokyo, Japan

Imported by:
Osotspa Taisho Pharmaceutical Co., Ltd., Bangkok, Thailand



Reg. No. 10

ยาใช้ภายนอก

ยาแก้ปวด

Menthol 4%

ใช้ภายนอก

ห้ามใช้กับผิวหนัง

ห้ามใช้กับผิวหนัง

ห้ามใช้กับผิวหนัง

ห้ามใช้กับผิวหนัง

ห้ามใช้กับผิวหนัง

ห้ามใช้กับผิวหนัง

ห้ามใช้กับผิวหนัง

ห้ามใช้กับผิวหนัง

ห้ามใช้กับผิวหนัง

ห้ามใช้กับผิวหนัง

For external use only.

Active ingredients :

Methyl Salicylate 10.2%

Eugenol 1.36%

Menthol 5.44%

store below 30° C.

Manufactured by

INTERTHAI PHARMACEUTICAL MANUFACTURING LTD.

Bangkok, Thailand. for Bristol-Myers Squibb Company, New York, U.S.A.

Apply Counterpain Cool Non-Methyl Salicylate Formula
analgesic gel for relief of minor aches and pains of muscles
associated with strains, sprains, bruises and sport injuries.

Easy to apply.

For external use only.

Do not use with heating pads or heating devices.

Active ingredient : Menthol 4%

Store below 30° C



PERSKINDOL



Classic

2

215

สเปรย์ Spray

สำหรับ
บรรเทาอาการ

for relief of
muscles aches

PERSKINDOL PERSKINDOL
Classic

เพรสกินดอล คลาสสิก
จะช่วยให้บรรเทา
อาการปวดของกล้ามเนื้อ
อาการปวดข้อ ปวดหลัง
ข้ออักเสบ คอแข็ง
เคล็ด ขัดขอย
อาการคันผิวหนังตามเนื้อตัว
สามารถใช้ทาตามข้อต่อ
บริเวณศีรษะตามแนวผม

Reg. No. TC 122143

Active Ingredients
Menthol 1,1%, Pine Oil 1,1%, Wintergreen Oil 0,35%,
Eucalyptus Oil 0,1%, Rosemary Oil 0,1%,
Limonene 0,1%, Linalyl Acetate 0,1%,
Linalool 0,1%, Terpineol 0,1%,
Terpenyl Acetate 0,1%

Produced by Pharm. Singer AG, Niederurnen, Switzerland
Imported by Lualaba Pharmacy Ltd.,
110 Phnom Penh, Cambodia

PERSKINDOL PERSKINDOL
Classic

เพรสกินดอล คลาสสิก
จะช่วยให้บรรเทา
อาการปวดของกล้ามเนื้อ
อาการปวดข้อ ปวดหลัง

PERSKINDOL Classic
relief of minor aches
of muscles and joints
backache, arthritic
stiff neck, bruise

Active Ingredients

1,1%, Wintergreen Oil 0,35%, Orange Oil 0,4%,
Eucalyptus Oil (free of furocumarin) 0,1%, Rosemary Oil
0,1%, Linalyl Acetate 0,1%, Linalool 0,1%,
Terpineol 0,1%, Terpenyl Acetate 0,1%

Produced by Pharm. Singer AG, Niederurnen, Switzerland
Imported by Lualaba Pharmacy Ltd.,

PERSKINDOL PERSKINDOL
Classic

เพรสกินดอล
จะช่วยให้บรรเทา
อาการปวดข้อ

PERSKINDOL



Cool

PERSKINDOL
Cool

The cooling effect
provides relief of muscles
aches and pains and
decreases the swelling after
sprains
bruises
muscle strains

Observe a minimum distance of 15 cm

See package insert for more information.

See bottom for
Lot No., Mfg Date, Exp. Date


Active Ingredient

5mg l-Menthol/1g

ant: Propane, Butane, Dimethyleth

สำหรับ
บรรเทาอาการ
ปวดกล้ามเนื้อ

for relief of
muscles aches
and pains



200518 8 8905

*68288

โอสกศาลา

205.00

PERSKINDOL



Classic

PERSKINDOL
Classic

บรรเทาอาการ
ปวดหลัง
ข้ออักเสบ
การฉีกตัวของกล้ามเนื้อ
คอเคล็ด
เคล็ด - คอยอก
การปวดของกล้ามเนื้อ
การฟกช้ำ

PERSKINDOL
Classic

For minor relief of
backache
arthritis
sprains
stiff neck
sprains
cramps
bruises

Active Ingredients

le Oil 1,35%, Wintergreen Oil 0,35%, Orange
gamot Oil (free of furocumarin) 0,1%, Rose
il 0,02%, Terpineol 0,1%, Terpenyl Acetate 0,

บรรเทา
อาการ
ปวดกล้ามเนื้อ
และ
การฟกช้ำ

Muscles aches
and pains

150 ml



Switzerland

ยาพ่นระงับอาการปวดกล้ามเนื้อ ฟกช้ำ เคล็ดขัดยอก

แอมเม็ลทซ์

โยโกะ โยโกะ

ใช้ง่าย คลายปวดเมื่อย



68317

14300



MUSCULAR ACHES

AMMELTZ YOKO YOKO



ยาทาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก



β -sitosterol, น้ำมันงา sesame oil, beeswax

MEBO®

Reg. No. 1C 84/39(N)



Indications: For the treatment of burns, scalds, chemical and electrical burns, and external wounds. It can heal wounds from burns. Main Active Constituents: β -sitosterol 0.25%



ข้อบ่งใช้
ใช้สำหรับรักษาแผลไฟไหม้ แผลลวก แผลเผาไหม้
จากวัสดุเคมี ไฟฟ้า และบาดแผลภายนอก
วิธีใช้ (ดูในเอกสารกำกับยา)

ยาใช้ภายนอก

MEBO®



MEBO®

湿润烧伤膏

徐荣祥教授监制

•68341

ไอสดมา

285.00



ข้อบ่งใช้
ใช้สำหรับรักษาแผลไฟไหม้ แผลลวก แผลเผาไหม้
จากวัสดุเคมี ไฟฟ้า และบาดแผลภายนอก
วิธีใช้ (ดูในเอกสารกำกับยา)

ยาใช้ภายนอก



MEBO®

•68458

ไอสดมา

72.00

美寶®

MEBO®

Indications: For the treatment of burns, scalds, chemical and electrical burns, and external wounds. It can heal wounds from burns. Main Active Constituents: β -sitosterol 0.25%





၅၇



งา



ขี้ผึ้ง

ตำรับยาเบญจอำมฤตย์

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรม
พัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยถึง
ความคืบหน้าการพัฒนาตำรับยาสมุนไพรรักษา มะเร็งตับว่า
หลังจากเปิดตัวตำรับเบญจอำมฤตย์ โดยทดลองให้บริการกับผู้ป่วย
โรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายที่โรงพยาบาลการแพทย์ ผสมผสานที่
ยศเส จำนวน 50 คน เป็นผู้ชาย 35 คน ผู้หญิง 15 คน เพื่อติดตาม
ผลการใช้ยาตำรับดังกล่าว พบว่า ตลอดระยะเวลา 20 วัน ผู้ป่วย
มีการการดีขึ้น

ตำรับยาเบญจอำมฤตย์

โดยผู้ปวยมี

อาการตาเหลือง ตัวเหลืองลดลง

เวียนศีรษะลดลง คลื่นไส้อาเจียนลดลงเมื่อทานมาก อาเจียน

เจ็บชายโครงขวาลดลง

ท้องอืดหลังทานอาหารดีขึ้น

นอนหลับพักผ่อนนานขึ้น

ท้องบวมลดลง เรอ ผายลมได้

หายใจไม่ทั่วท้องดีขึ้น

ตำรับยาเบญจอำมฤตย์

อยู่ในตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์

- มหาหิงค์ ๑ ยาดำบริสุทธิ ๑ เอาสิ่งละ ๑ สลึง รงทอง ๒ สลึง มะกรูด ๓ ผล
- เอามหาหิงค์ ยาดำ รงทอง ใส่ในมะกรูดสิ่งละผล แล้วเอามูลโค พอกสุ่มไฟเกลบให้สุก
- รากทนต์ ๒ สลึง ดีเกลือ ๔ บาท
- จิงแห้ง ๑ ดีปลี ๑ พริกไท ๑ เอาสิ่งละ ๑ สลึง



อำพล บุญเปล่ง ตรวจสอบเครื่องยา และ อุบลวรรณ บุญเปล่ง ถ่ายภาพ
ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำรับยาเบญจอำมฤตย์

- หมายเหตุ การสะตุเครื่องยาเมาเบื่อในตำรับยานี้ ใช้มะกรูด, มุลโค, แกลบข้าว, และกำเคาจากแกลบข้าว จึงจะสะตุยาได้ฤทธิ์เครื่องยาเหมาะสมกับตำรับยานี้เท่านั้น ห้ามใช้วิธีอื่นเป็นขาด
- ดิเกลือต้องเป็นดิเกลือไทยเท่านั้น กระทำเป็นจูน หมายถึงกว่าละเอียด คือเปรียบดั่งพงแพ้ง
- และจักต้องใช้น้ำส้มมะขามเปียกเป็นกระสายยาเป็นเครื่องเชื่อมประสาน ปั้นเป็น ลูกกลอนแล้วต้องได้น้ำหนัก ๑ สลึงพอดี
- ห้ามนำไปปรุงด้วยกรรมวิธีอื่นต้องกระทำดังระบุไว้ในตำรับเท่านั้นจึงสำเร็จสรรพคุณตามตำรับได้

ตำรับยาเบญจอำมฤตย์

- **เครื่องยาหลัก** มหาหิงค์
ยาคำ รงทอง
- **เครื่องยาช่วย** รากทนต์
ดีเกลื้อ
- **เครื่องยาประกอบ**
ขิงแห้ง ดีปลี พริกไท
- **สรรพคุณ** ถ่ายลม ถ่ายน้ำเหลือง
ถ่ายเสมหะแลโลหิตที่เป็นพิษ กัด
ฟอกเสมหะแลโลหิต
- **สรรพคุณ** ถ่ายเสมหะ ถ่ายน้ำเหลือง
เสีย ขับเมือกมันในลำไส้
- **สรรพคุณ** ขับเสมหะ เจริญอากาศ
ธาตุ แก้ปถวีธาตุพิการ แก้เสมหะ
เฟื่อง

ตำรับยาเบญจอำมฤตย์

- ตำรับนี้ใช้เป็น ยารุ หมายถึงสั่งอันเกิดแต่น้ำเหลืองและเลือดที่เป็นพิษ นั้น และเป็นเหตุปลายที่เกิดมิใช่เหตุต้น จักเห็นว่า **เครื่องยานี้มีแต่สรรพคุณเป็นหลัก** แพทย์จักต้องวางด้วยความระมัดระวัง ต้องพิจารณา กำลังโรคแลกำลังกายของผู้ใช้ว่ามีแรงต้านทานแรง โอสถสารของเครื่องยาในตำรับนี้ได้
- หมายเหตุ กริสัง คืออาหารเก่า กากอาหารที่ตกจากลำไส้เล็กมาอยู่ใน ลำไส้ใหญ่ตอนล่าง และตกไปทวารหนัก

ตำรับยาเบญจอำมฤตย์

- การรักษา จำต้องดำเนินต่อไปหลังจากวางยาตำรับนี้แล้ว เมื่อประระเมหะแตกตัวกระจายออกไป บุพโพและโลหิตจกสะสมมากขึ้น ผู้ไข้เริ่มมีกำลัง ทยต๋อสู่อำลัังโรคได้มากขึ้น และจกต้องวางเคียงกับยาบำรุงโลหิตเสมอไป
- เมื่อผู้ไข้มีกำลังทยดีขึ้น แพทย์จกต้องล้อมอาการข้างเคียงของโรคที่ดำเนินอยู่นั้น พร้อมกับการรักษาไปที่สมุฐานต้นทางของโรคตามที่แพทย์ได้วินิจฉัยไว้ก่อนแล้ว
- หลังจากนั้นจึงปรับธาตุบำรุงธาตุต่อไปจนผู้ไข้สมบูรณ์พร้อมปรกติ พร้อมนี้แพทย์พึงวางลำดับอาหารที่เหมาะสมแก่โรค และงดอาหารที่ผิดล้ำแดงต่อโรคประกอบตลอดการรักษา นั้น ที่สำคัญแพทย์ไม่รักษาเพียง ทย แต่รักษาใจผู้ไข้ไปพร้อมกัน เป็นเช่นนี้มาแต่โบราณกาล